

CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR SUR LA FIÈVRE DE LA VALLÉE DU RIFT (FVR)

AVEC DES INFORMATIONS CORRECTES, ON PEUT EVITER AUX PERSONNES OU ANIMAUX D'ATTRAPER LA FIÈVRE DE LA VALLÉE DU RIFT.



Avec la pluie arrivent les moustiques

Les moustiques peuvent transporter des virus qui rendent les animaux et les gens malades

La FVR peut causer des maladies graves et la mort chez les animaux

Les animaux malades peuvent rendre les gens malades

Chez l'homme, la FVR est une maladie qui est généralement bénigne

Les personnes atteintes de la FVR ne peuvent pas donner la maladie à d'autres



À L'ATTENTION DES BERGERS, FERMIS, BOUCHERS ET EMPLOYÉS D'ABATTOIRS

En général, le bétail, tel que les chèvres, les vaches et les moutons, est atteint par la fièvre de la vallée du Rift avant les humains. Les humains peuvent tomber malades après être entrés en contact avec des animaux contaminés. **La FVR ne se transmet pas d'une personne à l'autre.**


LA FIÈVRE DE LA VALLÉE DU RIFT CHEZ LES ANIMAUX

La FVR touche gravement les animaux. Cette maladie entraîne des avortements spontanés, des animaux mort-nés et une hausse de la mortalité chez les jeunes animaux.

D'AUTRES SYMPTÔMES DE LA MALADIE CHEZ LES ANIMAUX PEUVENT SE PRÉSENTER COMME SUIT:




Perte d'appétit



Faiblesse



Diminution de la production de lait



Vomissements



Écoulement nasal



Diarrhées

Si vous remarquez l'un de ces signes et symptômes, veuillez les signaler aux responsables du village et responsables de la santé. Après avoir guéri de la fièvre de la vallée du Rift, les animaux ne sont plus contagieux pour les humains.

LA FIÈVRE DE LA VALLÉE DU RIFT CHEZ L'HOMME

La plupart des personnes atteintes de la FVR ne présentent peu ou pas de symptômes.

La FVR ne se transmet pas d'une personne à l'autre.

Les personnes qui contractent la maladie peuvent aussi présenter les symptômes suivants:

Fièvre

Faiblesse

Maux d'estomac

Diarrhées

Douleurs articulaires

Sensation de vertige

Perte de poids



Les patients se rétablissent en général au bout de 2 à 7 jours après l'apparition des symptômes à condition d'avoir bénéficié d'un traitement précoce.

Un nombre relativement faible de patients présentent des symptômes plus graves de la maladie, notamment:

- Des vomissements
- Des saignements (présence de sang dans les vomissements, les selles, les gencives, yeux rouges)
- Des maux de tête, un coma ou, des convulsions
- Une baisse de la vue, et parfois la perte de la vue

LORSQUE DES ANIMAUX OU DES MEMBRES D'UNE FAMILLE TOMBENT MALADES:



- Signalez les cas d'animaux malades, les avortements spontanés et les décès inattendus au vétérinaire responsable de la région.
- Ne touchez pas et n'enterrez pas de bétail mort. Appelez le vétérinaire responsable de la région pour qu'il se charge de l'élimination convenable du corps.



- Si vous vous sentez malade, veuillez vous rendre à la clinique ou à l'hôpital de votre région.
- Si vous tombez gravement malade, demandez de l'aide auprès des services de santé sans tarder pour ne pas compromettre votre pronostic vital.



U.S. Department of Health and Human Services
Centers for Disease Control and Prevention